

慢性疼痛で トラマドール塩酸塩OD錠25mg・50mg「KO」 を服用される方へ

脳内への痛みの伝達を抑え、
痛みをやわらげるおくすりです。

このおくすりは、非オピオイド鎮痛剤で治療困難な慢性的な痛みにおける鎮痛を目的に用いられます。

次のような方は服用する前に必ず
医師または薬剤師にご相談ください。

- 以前におくすりを服用してかゆみ、発疹などのアレルギー症状があらわれたことがある方。
- アルコール・睡眠剤・鎮痛剤・オピオイド鎮痛剤または向精神薬による急性中毒のある方。
- モノアミン酸化酵素阻害剤(MAO阻害薬)を服用している方。
- 症状が十分にコントロールできていないてんかんのある方。
- 妊娠または妊娠している可能性がある方、または授乳中の方。
- 他のおくすりを服用している方(作用を強めたり、弱めたりする可能性があります)。
- 12歳未満の小児の方。

裏面も必ずお読みください。▶▶▶

このおくすりを服用するときには以下のことに注意してください。

- 医師または薬剤師に指示された服用方法にしたがって、服用してください。
- このおくすりは、舌の上のにせ、だ液で湿らせて軽くつぶし、水なしで服用することができます。また、コップ1杯程度の水またはぬるま湯でも服用することができます。寝たままの状態では、水なしで服用しないでください。
- 服用を忘れた場合には、気が付いたときにできるだけ早く服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合は、1回分飛ばしてください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。
- 眠気、めまい、意識消失が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないでください。
- 吐き気、嘔吐、便秘、食欲減退などの症状があらわれる事があります。
- 飲酒によりこのおくすりの作用や副作用が強まることがあるので、服用中の飲酒は控えてください。
- 誤って多く服用した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で服用を止めないでください。

次のような症状があらわれたときは、すぐに服用を中止し、
医師または薬剤師にご相談ください。

症状

- 冷汗、めまい、顔面蒼白、手足が冷たくなる
- 全身のかゆみ、蕁麻疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しさ
- 呼吸回数が減る、呼吸が浅くなる
- 顔や足の筋肉がピクピクする、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える
- あるおくすりを服用したいという強い思いがコントロールができない
- 手足の震え、発汗、幻覚、不眠
- 意識の消失

※上記以外でも気になる症状があらわれた場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

施設名