

# ゾニサミドOD錠25mg・50mgTRE「KO」を 服用される患者さんと そのご家族・介護者の方へ

## このお薬について

- このお薬は、パーキンソン病の運動症状や、レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム(手足の動作が緩慢になったり、筋肉が硬直したりする)を改善します。
- このお薬は、水なしでも飲める口腔内崩壊錠(OD錠)です。舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲んでください。普通のお薬と同じように、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲むこともできます。

## このお薬を服用するときには以下のことに注意してください。

- このお薬を飲んだ後に、眠気や注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないでください。
- このお薬を飲んだ後に、発汗減少があらわれることがあり、特に夏季に体温が上昇し熱中症を起こすことがあるので、高温環境下を避けるなど、体温上昇に気をつけてください。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近いときは1回分とばして次の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲まないでください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

裏面も必ずお読みください。

**服用する前に以下のような方は注意が必要な場合がありますので、必ず服用する前に、医師または薬剤師に伝えてください。**

- 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- 妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中である。
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

**また、以下のような症状があらわれた場合には、すぐに主治医または薬剤師に相談してください。**

眠気、ジスキネジア\*、気力低下、抑うつ（気分が落ち込み憂うつになる）、めまい・ふらつき、睡眠障害、頭痛・頭重感、幻視・幻聴、食欲不振、吐き気、口や喉の渇き、胃部不快感、便秘、体重減少、立ちくらみ、むくみ、倦怠感、発熱、発汗減少など。

\*自分の意思とは無関係に身体の一部が勝手に動いてしまう不随意運動の一つで、口周囲に出ることが多い

上記以外でも気になる症状がある場合は、主治医または薬剤師に相談してください。

● 施設名：

製造販売元：**寿製薬株式会社**  
長野県埴科郡坂城町大字上五明字東川原198

2024年6月作成